

COVID-19 vaccination

Vejledning til gravide, ammende og par, som planlægger graviditet



Gravide og ammende kvinder

- Gravide kvinder anbefales rutinemæssig vaccination i 2. eller 3. trimester med Pfizer-BioNTech COVID-19-vaccinen (Cominarty®) og Moderna (Spikevax®).
- Ammende kvinder kan blive vaccineret med det samme.
- Da indholdsstofferne i vaccinationen ikke integreres i cellernes arvemateriale, er der teoretisk ikke mistanke om øget risiko for hverken mor eller foster/barn, hvis moderen vaccineres.



Kvinder og par som ønsker graviditet/fertilitetsbehandling

- Både kvinder og mænd anbefales COVID-19 vaccination uanset planlagt graviditet eller fertilitetsbehandling.
- Du kan tilmelde dig fertilitetsbehandling efter 2. vaccination.
- Da indholdsstofferne i vaccinationen ikke integreres i cellernes arvemateriale, er der teoretisk ikke mistanke om øget risiko for hverken mor eller foster/barn, hvis moderen vaccineres.

Hvis du var gravid på vaccinationstidspunktet

- Gravide der er blevet vaccineret i graviditeten anbefales at følge de normale graviditetskontroller.
- Hvis du bliver gravid mellem 1., 2. eller 3. vaccinedosis, anbefales det at du afventer 2. eller 3. dosis til 2. trimester.

For yderligere information om sikkerhed ved COVID-19 vaccination, henvises til Sundhedsstyrelsen.



Sundhedsstyrelsens
hjemmeside