

# COVID-19 graviditets- & fødselshåndtering ved telefon- og akutte henvendelser

Årsag til henvendelse  
- vurderer kliniske billede/problem

Kan håndteres telefonisk?

Behov for fremmøde?

- Påvist eller mistanke om COVID-19-syg med feber, tør hoste og træthed evt. i kombination med symptomer:**
  - øvre luftveje (tab af smags- og/eller lugtesans, stoppet næse, ondt i halsen, øjenbetændelse. Sjældnere ørepine)
  - generelle (hovedpine, muskelsmerter, rygmerter)
  - mave-tarm (appetitløshed, kvalme, opkast, diarré, mavesmerter)
  - hud (udslæt)
- Ved fødsel: spørg til symptomer hos partner/pårørende og hvis mistanke, skal denne testes (guidelinegruppen\* anbefaler test af partner uanset symptomer):**
  - Negativ test: Partner kan deltage under fødslen, også med milde symptomer. Ved moderate til svære symptomer kan partner ikke deltage.
  - Positiv test: partner skal blive hjemme

Nej

Ja

Vurdering som vanligt  
i obstetrisk regi

Indlæggelse > 24 timer/fødsel  
(evt. tidl. testsvar (> 48 timer))  
→ TEST for ny coronavirus

Enhver kontakt i graviditet/fødsel  
(evt. tidl. testsvar (> 48 timer))  
→ TEST for ny coronavirus

Håndteres i isolation

Informér om isolation.  
"Ringe" når udenfor afdelingen