

Gravide - gradsinddeling af øget risiko (høj vs. moderat) ved COVID-19

Gravide i høj risiko (klinisk ekstremt sårbare)	
Vaccinegruppe 5	
Nedsat immunforsvar	Organtransplanterede
	Knoglemarvs- eller stamcelletransplanterede indenfor de seneste 6 måneder
	Tilstande med øget risiko for infektion (f.eks. seglcelleanæmi eller svær kombineret immundefekt (SCID))
	Splenektomi
	<p>Indtagelse af immunsupprimerende medicin i en grad som øger risikoen for infektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patienter, der får mere end 7,5 mg prednisolon dagligt • Patienter i behandling med biologisk medicin <ul style="list-style-type: none"> ○ Vedrørende Retuximab: hæmmer B-celle-respons og kan dermed reducere antistofresponsen ved vaccinen, som det er set ved influenza vaccine. Man tænker dog ikke, at det er farligt, men at vaccinen måske ikke dækker lige så godt for denne gruppe patienter. Præparatet benyttes dos ikke så meget til gravide og gives med langt interval, hvorfor det foreslåes, at man giver COVID-19 vaccinen kort inden ny injektion af Retuximab gives. • Patienter i 2-stofs immunsupprimerende behandling af inflammatorisk tarmsygdom
Kræftsygdom	Kemoterapi eller antistofbehandling mod kræft, inkl. immunterapi.
Lungesygdom	<p>Alvorlig lungesygdom, f.eks. cystisk fibrose, svær astma eller svært nedsat lungefunktion på anden baggrund</p> <p>Vedrørende svær astma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FEV1 <70% af forventede værdi eller • Fast (=daglig) prednisolon-behandling uafhængigt af dosis • En eller flere akutte forværringer/eksacerbationer indenfor de seneste 12 måneder behandlet med prednisolonkur
Hjertesygdom	<p>Svær hjertesygdom:</p> <p>Kompleks medfødt hjertesygdom (GUCH).</p> <p>Dog frasat bikuspid aortaklap med ingen/let aortainsufficiens/-stenose,</p>

	<p>velopereret coarctatio med ingen/velbehandlet hypertension, simple skillevægsdefekter (ASD, VSD og AVSD) uden betydende klapsygdom.</p> <p>Erhvervet hjertesygdom: Moderat til svært symptomatisk hjertesvigt med begrænsning i fysisk aktivitet (NYHA II-IV) Tilstand med forhøjet blodtryk i lungekredsløbet (pulmonal hypertension)</p>
Nyresygdom	Kronisk nyresvigt <ul style="list-style-type: none"> • eGFR<60 • nefrotisk syndrom med plasma albumin <20 gr/l og/eller dialyse
Gravide i moderat risiko (klinisk sårbare)	
Vaccinegruppe 10	
Hjertesygdom	Hjerte-karsygdom (f.ex hjertesvigt)
Nyresygdom	Kronisk nyresygdom Med påvirket kreatinin
Endokrinologisk sygdom	Svær diabetes (type 1 og 2 (ikke gestationel diabetes)) På linie med ikke gravide diabetikere: <ul style="list-style-type: none"> • Påvirket nyrefunktion (forhøjet creatinin) • HbA1c>70 efter gestationsalder 12
	Ekstrem overvægt (BMI >40)
Lever sygdom	Lever sygdom (f.eks. hepatitis)