

Bilag 1

Retningslinjer for partus provocatus procedurer fra de fem regioner

	CTG før	Præparat	Adm.vej	Dosis, 1. dag	Dosis, 2. dag	Overvågning efter	Andet
Skejby Region midt (24)	20min.	Misoprostol	Oralt	50mikrogram	100mikrogram	-	
Aalborg Region Nord (25)	30min.	Minprostin	Vaginalt	3mg x2, (6-8t. int.)		CTG 30min. + CTG ved veer indenfor 1t. + afd. 1t.	
Odense Region Syddanmark (26)	30min.	Misoprostol	Vaginalt	25mikrogram x1	50mikrogram x1	CTG 30min. + CTG ved veer indenfor 1t. + afd. 1t.	Stimulation gentages ikke ved beg. kontraktioner
Odense	30min.	Minprostin	Vaginalt	3mg x2, (6t. int.)	3mg x2, (6t. int.)	CTG 30min. + CTG ved veer indenfor 1t. + afd. 1t.	Stimulation gentages ikke ved beg. kontraktioner
Hvidovre Region Hovedstaden (27)	30min.	Misoprostol	Oralt	50mikrogram x2, (min. 4t. int.)	50mikrogram x2, (min 4t. int.)	-	Vurdering af bishop-score inden p.p.med.
Roskilde sygehus Region Sjælland (bilag på CD-rom)	20 min	Misoprostol	Vaginalt	25 mikrogram x 1	25 mikrogram x efter 5 timer.	Vente liggende 1 time efter oplæggelse. Derefter CTG 30 min.	Minprostin bruges ved komplicerede graviditeter.